

Basistherapie des chronischen Handekzems mit Imlan® Creme Pur und Imlan® Creme Plus

Zusammenfassung	In zwei verschiedenen nicht-interventionellen Studien (NIS) an insgesamt 199 Patienten wurde der Einsatz von Imlan® Creme Pur und Imlan® Creme Plus in der Basistherapie des chronischen Handekzems (CHE) unterschiedlicher Genese und Schweregrade untersucht. Unter stationären Bedingungen (NIS 1) an 99 und unter ambulanten Bedingungen (NIS 2) an 100 Patienten. Bei überwiegend hervorragender bis guter Verträglichkeit stellte sich heraus, dass bei leichten Verlaufsformen des CHE die alleinige Basispflege mit Imlan® Creme Pur oder Imlan® Creme Plus ausreichend für eine Abheilung ist. Imlan® Cremes eignen sich zur Basispflege sämtlicher Formen und Schweregrade von Handekzemen.
Hintergrund	Betulin-Emulsionen sind W/O-Emulsionen, die auf alle Zusatz- und Reizstoffe wie Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Duft- und Farbstoffe, sowie Lanolin und Paraffin verzichten. Sie werden seit mehreren Jahren im Bereich der medizinischen Hautpflege und des Hautschutzes eingesetzt.
Studienziel	Die vorliegenden nicht-interventionellen Studien (NIS) prüften die Eignung von Imlan® Creme Pur und Imlan® Creme Plus für die Basistherapie des chronischen Handekzems (CHE) unter stationären sowie ambulanten Bedingungen.
Prüforte	Hautklinik Psorisol Hersbruck (NIS 1), Hautklinik der Universitätsklinik Homburg/Saar und Dermatologie iDerm der Universität Osnabrück (beide NIS 2).
Prüfpräparat	Betulin-Emulsionen: Imlan® Creme Pur (Wasser, Jojobaöl, Betulin), Imlan® Creme Plus (Wasser, Jojobaöl, Betulin, Bienenwachs, Urea 3%)
Anwendung	In der NIS 1 wurden im Rahmen der stationären Therapie 99 Patienten mit CHE mit Betulin-Emulsionen als Basistherapie behandelt. In der NIS 2 waren es 100 ambulant behandelte Patienten. Die Anwendungsdauer variierte von 3-21 Tagen (NIS 1) bzw. 14 Tage im Median (NIS 2). Der Schwerpunkt der Beurteilung lag bei der Verträglichkeit. Erhoben wurden weiterhin, soweit möglich, der Anteil am Therapieerfolg sowie der Anwendungskomfort. In beiden NIS ergaben sich keine Unterschiede zwischen Creme Pur und Creme Plus.

Ergebnisse


NIS 1: Die Verträglichkeit wurde von 89,8% der Patienten als „hervorragend“ bis „gut“ beurteilt. Wesentliche Effekte der Basispflege auf den Therapieerfolg insgesamt konnten aufgrund der im stationären Bereich intensiven und komplexen Therapie nur abgeschätzt werden.

NIS 2: Die Beurteilung der Verträglichkeit erfolgte durch den Prüfarzt. Hier wurde die Verträglichkeit bei 85,4% der Patienten als „sehr gut“ bis „gut“ beurteilt. Wichtiges Ergebnis war, dass bei leichtem CHE die meisten Ekzeme allein mittels Basispflege mit Imlan®-Cremes abheilten oder sich auf einen nur trockenen Hautzustand verbesserten.

Fazit


Betulin-Emulsionen eignen sich zur Basistherapie sämtlicher Formen und Schweregrade von Handekzemen, bei leichten Handekzemformen reichen Betulin-Emulsionen sogar als alleinige Maßnahme aufgrund des entzündungshemmenden Effekts aus. Betulin-Emulsionen können daher auch als Basistherapie des berufsbedingen Handekzems im Berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren nach § 3 Berufskrankheitenverordnung in Betracht gezogen werden.

Ergebnisse 1: Verträglichkeit der Basistherapie, NIS 1+2



N=194; Angaben: % der Patienten

Ergebnisse 2: Behandlungs-Erfolg NIS 2, nur Basistherapie





Birken AG
Streiflingsweg 11
75223 Niefern-Öschelbronn

Telefon: +49 (0)7233 9749-200
Telefax: +49 (0)7233 9749-210

Nutzungsrechte

Copyright © 2016 Birken AG; alle Rechte vorbehalten.

Zur Verfügung gestellte Dokumente dürfen nur zu Informationszwecken verwendet werden.
Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe. Die Dokumente dürfen nicht kommerziell verwendet werden.

Markenschutz

Imlan® ist eine eingetragene Marke der Birken AG.